



OČKOVACÍ SEZÓNA 2026/2027

OČKOVACÍ LÁTKA

Vakcína Efluelda

ZAČÍNÁME OČKOVAT PROTI CHŘIPCE!

- Efluelda je určena pro dospělé ve věku 65 let a starší z důvodu prevence chřipkového onemocnění, **ideální čas k očkování je říjen – prosinec.**
- **Pacientům nad 65 let je hrazena z veřejného zdravotního pojištění** ve znění zákona 48/1997 Sb. Vakcinační akce č.j.: MZDR 29910/2025-6/OVZ.
- Vakcína je určena také k prevenci chřipky u dospělých od 60 let věku v souladu s oficiálním doporučením bez úhrady z veřejného zdravotního pojištění, lze ale využít za úhradu příspěvky zdravotních pojišťoven v rámci preventivních programů.
- **Efluelda – vysokodávková vakcína** je specificky navržena pro **posílení ochrany** starších osob se **4x vyšším množstvím antigenu** ve srovnání se standardní vakcínou.
- Efluelda injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Tetravalentní vakcína proti chřipce (štěpený virion, inaktivovaný), 60 mikrogramů HA/kmen.

Tato vakcína splňuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) (pro severní polokouli) a doporučení EU pro sezónu 2026/2027.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Očkování je jednoduché a bezpečné- Potenciálně může zachránit život (nejen u rizikových skupin pacientů)- Pomáhá předejít onemocnění a hospitalizaci- Světová zdravotnická organizace považuje každoroční očkování za nejúčinnější ochranu proti chřipce | <ul style="list-style-type: none">- Vysoce nakažlivé virové onemocnění- Inkubační doba 12 – 48hod.- Viry chřipky každoročně podléhají mírným mutacím – vakcíny jsou každým rokem aktualizovány, aby chránily před aktuálně cirkulujícími kmeny chřipky- Komplikace: zvýšené riziko hospitalizací, zhoršení chronických onemocnění, kardiovaskulární komplikace, respirační komplikace, snížení soběstačnosti, vedlejší zánět dutin, zánět středního ucha a další- 50–70 % hospitalizací a 70-85% úmrtí v souvislosti s chřipkou je u lidí nad 65 let- U polymorbidních pacientů a rizikových skupin může vyvolat velmi závažné stavy až smrt |
|---|---|